



**Région : Sud-Est ( Dép. Isère)  
Date : 25/02/2020**

*Le campagnol des champs (Microtus arvalis) cause d'importants dégâts en cultures porte-graine (notamment dans les fourragères pérennes). La surveillance des parcelles s'impose tout au long de l'année.*

### Informations sur le réseau de biosurveillance

Les informations contenues dans ce bulletin ont pour objectif d'informer sur les niveaux de présence observés dans quelques parcelles à l'échelle d'un territoire. Les observations de la FNAMS et de ses partenaires, dans le cadre des réseaux de biosurveillance, donnent une indication dite de « surveillance » sur l'activité des rongeurs. Elles n'ont pas valeur de comptage officiel en vue d'un traitement curatif le cas échéant (possible uniquement après comptage à la parcelle et prise de contact auprès de la FREDON) (voir Infos pratiques).



Surveillez bien vos propres parcelles, car au sein d'une même zone de production, l'activité des rongeurs est très variable d'une parcelle à l'autre.

### Commentaire général sur la présence de campagnols

Globalement le niveau des populations de campagnol des champs a augmenté par rapport à la précédente date de comptage (10 Décembre 2019).

Sur 8 parcelles, une seule a été observée avec aucune présence active de campagnol. 5 parcelles sont en dessous des 33% d'activité, et 2 parcelles au-dessus des 33% d'activité, dont une avec un taux très élevé 69% d'activité.

### Etat des lieux sur l'activité des campagnols en cultures fourragères porte-graine


Les résultats d'observations présentés ci-dessous correspondent à quelques parcelles suivies dans le cadre des réseaux de biosurveillance co-organisés par la FNAMS et la FREDON. Attention, ces informations ne peuvent pas assurer une représentativité de présence et du risque à l'échelle d'un territoire.

Données présentées en % de parcelles classées par niveau d'activité des rongeurs (méthode indiciaire).

% de parcelle à 0% d'activité
  % parc. entre 0.1% et 15%
  % parc. entre 15.1 et 33%
  % parc. >33%

Département(s) : Isère (38)  
Communes: Colombe  
Culture(s) : dactyles, fétuques élevées

### Sortie d'Hiver 25/02/2020



### Informations pratiques

Pour tout complément d'information et mise en œuvre d'une stratégie de lutte contre le campagnol (incluant l'application d'appâts à la bromadiolone) contactez votre correspondant FREDON.

[www.fredonra.com](http://www.fredonra.com) (contact : Catherine Prave - Tél 04 74 86 40 68)

→ Voir également la Note Technique FNAMS « Lutte contre le campagnol des champs » NTE 04, sept 2015 Téléchargeable sur [www.fnams.fr](http://www.fnams.fr) / Ressources documentaires / Fourragères / Bulletins de biosurveillance  
Vous souhaitez participer aux observations ? → RDV à la même adresse (Mémo observateur et formulaire de saisie en ligne)

NB : Ce bulletin de biosurveillance est réactualisé en cours de campagne et disponible sur [www.fnams.fr](http://www.fnams.fr)